



CONSELL INSULAR
DE MENORCA

DEPARTAMENT D'ECONOMIA,
MEDI AMBIENT I CAÇA



**MENORCA
TALAIÒTICA**

Candidata Patrimoni Mundial

Edifici "Sa Granja"
Ctra. des Grau, km 0,5
07700 Maó
Tel 971356317
Fax 971350928

PREVENCIÓN DEL PICUDO ROJO:

CORRECTA REALIZACIÓN DE PODA EN PALMERAS

- 1. Podar sólo en los meses de enero y febrero.**
- 2. Minimizar las heridas al realizarse la poda.
Cortes limpios, sin desgarros.**
- 3. Realizar un tratamiento fitosanitario inmediato al ojo y a la valona. Se aconseja un producto fitosanitario autorizado sistémico tipo imidacloprid.**
- 4. No afeitar o cepillar los estípites o troncos de la palmera.**
- 5. Comunicar inmediatamente al Area de Agricultura del CIM cualquier detección de la plaga del picudo rojo de las plameras, *Rhynchophorus ferrugineus*.**
- 6. Realizar podas no agresivas intentando eliminar sólo hojas secas, inflorescencias y frutos.**
- 7. Sellar las heridas de poda con cicatrizantes (por ejemplo compuestos cúpricos).**
- 8. Eliminación rápida de los restos de poda, el olor de la zona del corte es extremadamente atraente para el picudo.**